



C42 : CANCER DU SEIN TRIPLE NÉGATIFS CHEZ LA FEMME JEUNE

Titre

Français : CANCER DU SEIN TRIPLE NÉGATIFS CHEZ LA FEMME JEUNE

Anglais : NEGATIVE TRIPLE BREAST CANCER IN YOUNG WOMEN

Auteurs

Hafid REMOUCHE (1), KHEDIDJA BELKHARROUBI (1), RAMZI GRAICHI (1), YASSER IKKACHE (1), OMAR BOUALGA (1), BOUABDELLAH KRELIL (1)
(1) Chirurgie Générale et cancérologie, CHU , CHU ORAN ALGERIE, 31000, ORAN, ALGÉRIE

Responsable de la présentation

Nom : REMOUCHE

Prénom : HAFID

Adresse professionnelle : CHU Oran SERVICE DE CHIRURGIE GENERALE ET CANCEROLOGIE "PAV 10"

Code postal : 31000

Ville : Oran

Pays : ALGERIE

Newsletter :

Mots clés

Français : sein, chirurgie, chimiothérapie, jeune, triples négatifs, enquête génétique.

Anglais : breast, surgery, chemotherapy, young, triple negative, genetic survey.

Spécialité

Principale : Chirurgie

Secondaire : Autres

Texte

Contexte et objectifs : Le cancer du sein connaît une incidence qui croisse avec l'âge ainsi dans la majorité des cas il survient à partir de 45 ans. La survenue du cancer du sein chez un sujet de moins de 20ans est exceptionnelle.

Méthode et Résultat : Nous rapportant le cas d'une patiente C.R âgée de 18 ans aux antécédents familiaux de cancer du sein chez la mère à l'âge de 40 ans, admise au service de chirurgie générale pour la prise en charge d'un nodule du sein du sein droit du quadrant supéro-externe, de 02 cm de diamètre mobile par rapport au deux plans. Echographie mammaire couplé a la mammographie : un nodule spiculé, irrégulier de 15mm de diamètre, classée ACR 5 du sein droit, sans adénopathie axillaire homolatérale; dont la biopsie exèrese est revenue en faveur d'un carcinome lobulaire, RH(-) et HER (-) ; triples négatif.

Patiente opérée, geste fait : mastectomie+ curage axillaire homolatérale.

Examen histologique : Carcinome lobulaire avec infiltration ganglionnaire 2N+/16.

Un bilan d'extension a savoir un scanner thoraco-abdomino-pelvien + scintigraphie osseuse sont revenus sans particularités.

Patiente ayant subi un complément thérapeutique a base de chimio-radiothérapie adjuvante.

Discussion :

Parmi ces cancers frappant les femmes jeunes, on trouve une proportion plus importante de cancers du sein triple-négatif, ces cancers présentent des risques de diffusion de métastases beaucoup plus élevé que les autres cancers du sein avec un pronostic vital très défavorable. Ils représentent jusqu'à 20 % des cas diagnostiqués dans le monde et peuvent être liés à des prédispositions génétiques (en particulier des mutations des gènes BRCA1 ou BRCA2).

Conclusion : Le cancer du sein triple négatif chez la femme jeune pose de nombreuse problématique aux chirurgien et aux oncologues en terme de thérapeutique ?! L'intérêt de la consultation oncogénétique.