

Du 06 au 08  
Novembre 2019  
PALAIS DU PHARO,  
MARSEILLE

# Les cancers du sein de demain : le "big bang" ?

Prévention, Dépistage, Traitements  
et Évolutions sociétales

41<sup>es</sup> JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ  
FRANÇAISE DE SÉNIOLOGIE ET DE  
PATHOLOGIE MAMMAIRE

Organisateurs : Brigitte Séradour, Pascal Bonnier, Catherine Noguès et Anthony Gonçalves



## D18 : LE CARCINOME MAMMAIRE, L'HOMME EST AUSSI CONCERNE ! A propos de 27 cas

### Titre

**Français :** LE CARCINOME MAMMAIRE, L'HOMME EST AUSSI CONCERNE ! A propos de 27 cas

**Anglais :** MAMMARY CARCINOMA, MAN IS ALSO CONCERNED! About 27 cases

### Auteurs

D ADNANE (1)

(1) , , HMRUO, 31000, ORAN, ALGERIE

### Responsable de la présentation

**Nom :** ADNANE

**Prénom :** DOUNIA

**Adresse professionnelle :** HMRUO

**Code postal :** 31000

**Ville :** ORAN

**Pays :** ALGERIE

**Newsletter :**

### Mots clés

**Français :** cancer sein homme

**Anglais :** breast cancer man

### Spécialité

**Principale :** Chirurgie

**Secondaire :** Autres

### Texte

Contexte.

Le cancer du sein chez l'homme reste une pathologie rare et méconnue malgré l'augmentation récente de son incidence ces dernières années, peu d'études cliniques randomisées, y sont consacrées (1).

Objectif. Le but de notre étude était d'évaluer les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, radiologiques et évolutives du cancer du sein chez l'homme.

Matériels et méthode.

Notre série regroupe les données rétrospectives de 27 dossiers cliniques de cancer du sein chez l'homme, traités à l'HMRUO, entre 2010 et 2019.

Résultats.

La moyenne d'âge de cette série était de 58 ans, la durée moyenne d'évolution de la lésion de 9,1 mois, et la taille clinique moyenne des lésions de 32mm. Et 21 (77,77%) cas étaient opérables d'emblée et un creux N0 dans 19(70,37%) cas. La bilatéralité a été retrouvée dans 02(07,40%) cas.

L'absence de corrélation anatomo-radio-clinique a été constaté dans 15 (55,55%) cas, La mastectomie emportant la plaque aréolo-mamelonnaire avec un curage axillaire des deux étages de berg ont été réalisés chez tous les patients

Le carcinome canalaire infiltrant a été retrouvé chez tous les patient avec composante extrinsèque extensive dans 11(40,74%) cas, le grade II est le plus fréquemment retrouvé, 17 (62,96%) cas. L'immunohistochimie réalisée chez 06 (22,22%) cas, retrouve des récepteurs hormonaux positifs chez 04 (14,81%) cas, et un HER2 surexprimé dans 02 (0,03%) cas. Une chimiothérapie a été administrée chez 25(92,59%) cas, une radiothérapie dans 21(77,77%) cas et une hormonothérapie dans 24 (88,88%) cas, L'évolution a été émaillée par des récurrences locales dans 05(18, 51%) cas, des métastases dans 03(11,11%) cas, principalement hépatiques suivie des métastases pulmonaires. Avec une survie sans récurrences à 05 ans estimée à 64,13%.

Conclusion.

Le cancer du sein chez l'homme reste une pathologie rare, retrouvé le plus souvent chez l'homme de plus de 50 ans, avec un retard diagnostique plus lié au tabou qu'aux difficultés de diagnostic(2). Et malgré l'augmentation récente de son incidence ces dernières années, et en absence de particularité thérapeutique, son traitement reste calqué sur celui du cancer du sein chez la femme, avec un pronostic considéré comme plus défavorable. (3-4)

Bibliographie :

1. COMET B, CUTULI B, PENAULT-LLORCA F, BONNETERRE J, BELKACEMI Y. Cancer du sein chez l'homme : revue de la littérature. Bull Cancer 2009 ; 96 (2) : 181-9.
2. BEYROUTI M. I, BEYROUTI R, BEYROUTI RH BEN AMAR and al. Cancer du sein chez l'homme Presse Med. 2007 ; 36 : 1919-24.
3. SASCO AJ, LOWENFELS AB, PASKER-DE JONG P. Review article: epidemiology of male breast cancer. A meta-analysis of published case-control studies and discussion of selected aetiological factors. Int J Cancer 1993 ; 53 (4) : 538-49.
4. GOSS PE, REID C, PINTILIE M, LIM R, MILLER N. Male breast carcinoma: a review of 229 patients who presented to the Princess Margaret Hospital during 40-years : 1955-1996. Cancer 1999 ; 85 (3) : 629-39.