



## C31 : Le cancer du sein chez l'homme; Particularités diagnostiques et thérapeutiques.

### Titre

**Français :** Le cancer du sein chez l'homme; Particularités diagnostiques et thérapeutiques.

**Anglais :** Breast cancer in man ; Diagnostic and therapeutic features.

### Auteurs

D ADNANE (1)

(1) , , HMRUO, 31000, ORAN, ALGERIE

### Responsable de la présentation

**Nom :** ADNANE

**Prénom :** Dounia

**Adresse professionnelle :** HMRUO

**Code postal :** 31000

**Ville :** Oran

**Pays :** Algérie

**Newsletter :**

### Mots clés

**Français :** Cancer sein homme

**Anglais :** Breast cancer man

### Spécialité

**Principale :** Chirurgie

### Texte

Contexte. Le cancer du sein chez l'homme reste une pathologie rare et méconnue malgré l'augmentation récente de son incidence ces dernières années, peu d'études cliniques randomisées, y sont consacrées, il représente 1,3% des cancers mammaires.

Son pronostic a longtemps été considéré comme plus défavorable que celui de la femme(1).

Objectif. Le but de notre étude était d'évaluer les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, radiologiques et évolutives du cancer du sein chez l'homme. Matériels et méthode. Notre série regroupe les données rétrospectives de 27 dossiers cliniques de cancer du sein chez l'homme, traités à l'HMRUO,

Résultats. La moyenne d'âge de cette série était de 58 ans, la durée moyenne d'évolution de la lésion de 9,1 mois, et la taille clinique moyenne des lésions de 32mm. Et 21 (77,77%) cas étaient opérables d'emblée et un creux N0 dans 19(70,37%) cas. La bilatéralité a été retrouvée dans 02(07,40%) cas.

L'absence de corrélation anatomo-radio-clinique a été constaté dans 15 (55,55%) cas, La mastectomie emportant la plaque aréolo-mamelonnaire avec un curage axillaire des deux étages de berg ont été réalisés chez tous les patients

Le carcinome canalaire infiltrant a été retrouvé chez tous les patient avec composante extrinsèque extensive dans 11(40,74%) cas, le grade II est le plus fréquemment retrouvé, 17 (62,96%) cas. L'immunohistochimie réalisée chez 06 (22,22%) cas, retrouve des récepteurs hormonaux positifs chez 04 (14,81%) cas, et un HER2 surexprimé dans 02 (0,03%) cas. Une chimiothérapie a été administrée chez 25(92,59%) cas, une radiothérapie dans 21(77,77%) cas et une hormonothérapie dans 24 (88,88%) cas, L'évolution a été émaillée par des récidives locales dans 05(18, 51%) cas, des métastases dans 03(11,11%) cas, principalement hépatiques suivie des métastases pulmonaires. Avec une survie sans récidives à 05 ans estimée à 64,13%.

Conclusion. Le cancer du sein chez l'homme reste une pathologie rare, retrouvé le plus souvent chez l'homme de plus de 50 ans, avec un retard diagnostic plus lié au tabou qu'aux difficultés de diagnostic.

Et malgré l'augmentation récente de son incidence ces dernières années, et en absence de particularité thérapeutique, son traitement reste calqué sur celui du cancer du sein chez la femme, avec un pronostic considéré comme plus défavorable(2).

bibliographie:

(1). Abreu MH, et al. Male breast cancer: Looking for better prognostic subgroups. The Breast. 2015;26:18-24. [PubMed] [Google Schol

(2) Masci G, et al. Clinicopathological and immunohistochemical characteristics in male breast cancer: a retrospective case series. Oncologist. 2015 Jun;20(6):586-592