



D13 : Doit-on conserver le sein chez les patientes de plus de 75 ans ? : en France plutôt non.

Titre

Français : Doit-on conserver le sein chez les patientes de plus de 75 ans ? : en France plutôt non.

Anglais : Should we keep the breast in patients over 75 years old ? : in France rather no.

Auteurs

M HIVERT (1), Y KERBAGE (1), A GHENASSIA (2), G CLEMENT (2), X LENNE (2), P COLLINET (1), J PHALIPPOU (1)

(1) clinique de gynécologie, Hôpital Jeanne de Flandre : CHRU Lille, Avenue Eugène Avinée, 59000, LILLE, France

(2) Département d'information médicale, Pôle santé publique : CHRU LILLE, 2, avenue Oscar Lambret, 59037, LILLE CEDEX, FRANCE

Responsable de la présentation

Nom : HIVERT

Prénom : Mathieu

Adresse professionnelle : Clinique de gynécologie : Hôpital Jeanne de Flandre, CHRU Lille, Avenue Eugène Avinée

Code postal : 59000

Ville : LILLE

Pays : France

Newsletter :

Mots clés

Français : âgécancer du seinmastectomieFranceFemmeEvaluation gériatrique

Anglais : AgedBreast NeoplasmsmastectomyFranceFemaleGeriatric Assessment

Spécialité

Principale : Gynécologie

Texte

Contexte : Depuis 2007 la société internationale d'oncologie gériatrique (SIOG) recommande, pour les patientes de plus de 70 ans atteintes de cancer du sein (CS), une prise en charge chirurgicale similaire à celle proposée en population générale, sous couvert d'une évaluation onco-gériatrique compatible avec une chirurgie.

Objectif : L'objectif de cette étude est d'évaluer, pour les cancers du sein de la femme, l'influence de l'âge sur le taux de mastectomie totale (MT).

Méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective des données des cancers du sein traités par mastectomie entre 2010 et 2018, pour une population de femme âgées de plus de 50 ans. Ces données ont été extraites de la base de données française disponible dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d'information. Les effectifs de patientes ont été indexés sur le score de comorbidité d'Elixhauser. Nous avons défini par « âge moyen » les patientes âgées de 50-75 ans ; et par « âgée » les patientes âgées de ≥ 75 ans.

Résultats : Nous avons étudiés 493 106 cas de cancer du sein traités par mastectomie chez des patientes âgées de plus de 50 ans. On retrouve une différence de 16,6 points de pourcentage pour le taux de MT entre le groupe « âge moyen » (24,2%) et le groupe « âgée » (40,8%) ($p < 0,001$; IC 95% [-0,165 ; -0,168]). Les populations des 2 groupes ont été indexées au score de comorbidité d'Elixhauser ; on retrouve un taux de mastectomie significativement plus élevé, chez les patientes du groupe « âgée » pour chaque sous-groupes (score 0 à 12) avec une différence significative (entre 7 et 24 points de pourcentage selon les groupes) pour les 7 premiers groupes ($p < 0,001$) .

Discussion : En France, la mastectomie totale est utilisée de façon plus importante chez les patientes âgées de plus de 75 ans, sans pouvoir être expliqué par les comorbidités à elles seules.