41^{ES} JOURNÉES DE LA SOCIÉTE RANÇAISE DE SÉNOLOGIE ET DE PATHOLOGIE MAMMAIRE

Organisateurs: Brigitte Séradour, Pascal Bonnier, Catherine Noguès et Anthony Gonçalves



P09 : Reconstruction mammaire post-mastectomie chez les patientes âgées de 70 ans et plus : évaluation de la population opérable et de la population opérée. Etude transversale rétrospective au sein de l'Institut Bergonié à Bordeaux entre 2005 et 2018.

Titre

Français : Reconstruction mammaire post-mastectomie chez les patientes âgées de 70 ans et plus : évaluation de la population opérable et de

la population opérée. Etude transversale rétrospective au sein de l'Institut Bergonié à Bordeaux entre 2005 et 2018.

Anglais:

Post-mastectomy breast reconstruction in patients aged 70 and over: evaluation of the operable population and operated

population. A retrospective cross-sectional study at the Institut Bergonié in Bordeaux between 2005 and 2018.

Auteurs

A MARROC (1), C TUNON DE LARA (1), M FOURNIER (1), H CHARITANSKY (1), M DEBLED (2), N QUENEL-TUEUX (2), P LAGARDE (3), A PETIT (3), V BROUSTE (4)

- (1) Chirurgie Gynécologique, Institut Bergonié, 229 cours de l'Argonne, 33000, BORDEAUX, FRANCE
- (2) Oncologie, Institut Bergonié, 229 cours de l'Argonne, 33000, BORDEAUX, FRANCE
- (3) Radiothérapie, Institut Bergonié, 229 cours de l'Argonne, 33000, BORDEAUX, FRANCE
- (4) Statistiques, Institut Bergonié, 229 cours de l'Argonne, 33000, BORDEAUX, FRANCE

Responsable de la présentation

Nom: MARROC

Prénom: Audrey

Adresse professionnelle: Institut Bergonié, 229 cours de l'Argonne 33000 BORDEAUX, FRANCE

Code postal : 33000
Ville : Bordeaux
Pays : France
Newsletter :

Mots clés

Français : Reconstruction mammaire, mastectomie, patientes âgées **Anglais :** Breast reconstruction, mastectomy, elderly patients

Spécialité

Principale : Gynécologie **Secondaire :** Chirurgie

Texte

Introduction :

Le cancer du sein reste à ce jour le cancer le plus représenté dans la population féminine française avec 58459 nouveaux cas en 2018. L'âge moyen de diagnostic est de 61 ans. 30% des patientes doivent bénéficier d'une mastectomie totale. Le taux de reconstruction tout âge confondu est de 22,9%.

L'objectif principal de notre étude est d'évaluer les critères et conséquences de la réalisation d'une reconstruction mammaire ou non chez les patientes âgées de 70 ans et plus ayant bénéficié d'une mastectomie au sein de l'Institut Bergonié entre 2005 et 2018.

Matériel et méthode :

Il s'agit d'une étude transversale rétrospective monocentrique incluant les patientes âgées de 70 ans et plus ayant bénéficié d'une mastectomie unilatérale avec ou sans reconstruction entre Janvier 2005 et Décembre 2018 au sein de l'Institut Bergonié. Nous avons réparti cette population en deux groupes : patientes avec reconstruction mammaire et patientes sans reconstruction mammaire. Pour chacun des groupes nous avons décrit, à l'aide du recueil de données informatisées au sein de l'Institut et d'une enquête téléphonique auprès des patientes, les données démographiques et médicales, la présence ou non d'une proposition de reconstruction émise par le chirurgien ou la patiente, le refus ou non émanant du chirurgien ou de la patiente, le degré de satisfaction et la présence ou non de regret concernant la réalisation ou l'absence de réalisation d'une reconstruction mammaire.

Résultats :

Au total 578 patientes ont été traitées par mastectomie totale dans la période donnée. 59 patientes ont bénéficié d'une reconstruction mammaire

soit 10,21%.

262 patientes ont été incluses dans l'étude dont 59 reconstruites et 203 non reconstruites ou avec reconstruction différée.

En ce qui concerne la population reconstruite, 52 patientes (88,1%) ont reçu une information et proposition de la part du chirurgien. Le taux de satisfaction était de 87,5%. Un regret de reconstruction était exprimé par 7 patientes (12,5%) et 8 patientes supplémentaires exprimaient un regret du type de reconstruction. Les causes principales de regret étaient la présence de complications post opératoire (60%), la lourdeur de la chirurgie (60%), et le résultat esthétique (46,7%).

En ce qui concerne la population non reconstruite 33 patientes (16,4%) présentaient une contre-indication à la reconstruction. 83 patientes (43,8%) n'ont pas reçu d'information concernant la possibilité de reconstruction. 78 patientes (38,8%) ont refusé la reconstruction. Les principales causes de refus étaient le sentiment d'âge dépassé (48,7%) et la lassitude médicale (28,2%). 52 patientes (25,8%) exprimaient un regret de l'absence de reconstruction.

Conclusion:

En dépit de l'âge avancé de nombreuses patientes expriment une volonté de reconstruction mammaire et un regret de ne pas avoir bénéficié de celle-ci. Cependant il semble important d'informer les patientes des différentes possibilités de chirurgies réparatrices ainsi que de leurs possibles complications afin d'établir une population cible éligible à la reconstruction et de limiter le nombre de regrets.