

Du 06 au 08
Novembre 2019

PALAIS DU PHARO,
MARSEILLE

Les cancers du sein de demain :
le "big bang" ?

Prévention, Dépistage, Traitements
et Évolutions sociétales

41^{ES} JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ
FRANÇAISE DE SÉNIOLOGIE ET DE
PATHOLOGIE MAMMAIRE

Organisateurs : Brigitte Séradour, Pascal Bonnier, Catherine Noguès et Anthony Gonçalves



E09 : RECHUTE ET METASTASE EN CANCEROLOGIE MAMMAIRE: experience du service de gynecologie HMRUO/2°RM

Titre

Français : RECHUTE ET METASTASE EN CANCEROLOGIE MAMMAIRE: experience du service de gynecologie HMRUO/2°RM

Anglais : RECHUTE AND METASTASE IN MAMMARY CANCEROLOGY: experience of the gynecology department HMRUO / 2 ° RM

Auteurs

T SAHRAOUI (1), C ZAOUÏ (2), S GHERDAOUI (3), D ADNANE (4), S MASRAOUI (5), Y CHAABI (5), F HIBA (4)

(1) LBDD, UNIV ORAN1, SENIA ORAN, 31000, ORAN, ALGERIE

(2) LBDD, FACULTÉ DE MÉDECINE UNIV ORAN1, SENIA ORAN, 31000, ORAN, ALGERIE

(3) , USTO MB, BIR EL DJIR ORAN, 31130, ORAN, ALGERIE

(4) HMRUO, FACULTÉ DE MÉDECINE UNIV ORAN1, SENIA ORAN, 31000, ORAN, ALGERIE

(5) , FACULTÉ DE MÉDECINE UNIV ORAN1, SENIA ORAN, 31000, ORAN, ALGERIE

Responsable de la présentation

Nom : SAHRAOUI

Prénom : TOUFIK

Adresse professionnelle : UNIV ORAN1 SENIA

Code postal : 31000

Ville : ORAN

Pays : ALGERIE

Newsletter :

Mots clés

Français : cancer du sein, métastase, rechute, prise en charge thérapeutique.

Anglais : breast cancer, metastasis, relapse, therapeutic management.

Spécialité

Principale : Biologie

Secondaire : Autres

Texte

en Algérie le cancer du sein occupe le premier rang. c'est la première cause de mortalité par cancer chez la femme.

son évolution est imprévisible que ce soit par la survie sans rechute ou survie avec rechute.

l'objectif de ce travail, réalisé au service de gynécologie de l'HMRUO/2°RM sur 124 dossiers de patientes prise en charge pour cancer du sein, est de décrire la population ayant récidivé.

l'âge moyen de 51.4 ± 44 dont 64.43% de patiente ménopause, le type histologique le plus fréquent est carcinome canalaire infiltrant.

les 55.60% des tumeurs sont locorégionales, le site métastatique préférentiel est l'os 42.1%, suivi par le poumon 25.3%, le site le moins atteint est le cerveau à 5.3%.

Cette population est traitée principalement par la chirurgie (en première intention 81%), et la radiothérapie (87%) comme traitement locorégional.

Pour le traitement systémique la chimiothérapie est prescrite à toutes les patientes, le protocole TXT majoritairement en néoadjuvant et FEC/TXT en situation adjuvante, l'hormonothérapie (73,1%) dont l'anastrazole est la molécule principalement utilisée (48,9%), et l'immunothérapie (73%).

le cancer du sein est très hétérogène par ses caractéristiques clinicomorphologiques et ses sites préférentiels de métastases.