

D07 : Le cancer du sein de la femme de plus de 70 ans

Titre

Français : Le cancer du sein de la femme de plus de 70 ans

Anglais : Breast cancer in women over 70

Auteurs

K BRAHMI (1)

(1) CCA CHU Oran, Faculté de Médecine d'Oran. CHU ORAN, 76, Bd Benzerdjeb, , 31000, ORAN, ALGÉRIE

Responsable de la présentation

Nom : BRAHMI

Prénom : KHADIDJA

Adresse professionnelle : 76 Bd Benzerdjeb 31000, Oran Algérie

Code postal : 31000

Ville : ORAN

Pays : ALGÉRIE

Newsletter :

Mots clés

Français : Mots clés : cancer du sein, femme âgée, dépistage

Anglais : Keywords : breast cancer, elderly woman, screening

Spécialité

Principale : Chirurgie

Texte

Contexte.

Le cancer du sein de la femme de plus de 70 ans présente des caractéristiques différentes en comparaison avec celui de la femme jeune. Par conséquent dans cette tranche d'âge il est nécessaire de faire une évaluation gériatrique et oncologique. Toutes les études montrent une augmentation de l'incidence avec l'âge. Nous présentons les aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques d'une série de 165 patientes prises en charge au CHU d'Oran durant la période de février 2015 à octobre 2019.

Les objectifs sont épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques.

Méthodes.

Il s'agit d'une étude rétrospective de 165 femmes de plus de 70 ans, atteintes d'un cancer du sein et traitées durant la période 2015- 2019 au CHU d'Oran. L'examen clinique est minutieux et complet de la glande mammaire et des autres appareils. Un bilan complémentaire de la tumeur et de la patiente est réalisé ainsi qu'un bilan d'extension, TDM TAP et scintigraphie osseuse au minimum. Les modalités thérapeutiques ont été décidées en RCP en prenant en compte les comorbidités. Le score G8 oncologie a été utilisé pour l'évaluation gériatrique.

Résultats.

L'âge moyen était de 75 ans (72- 89), le délai moyen de consultation en chirurgie est de 18 mois. Les motifs de consultation sont cliniques, en majorité un nodule malin du sein découvert par autopalpation dans 76% et une mammographie de dépistage ACR5 dans 14%. Dans 80% le diagnostic est facile et des comorbidités existent dans 59%. Les patientes sont scorées G8 15 (18,5%), G8 12 (64,7%), G8 10.5 (8,4%). La taille tumorale moyenne était de 33mm, 69% des tumeurs sont T2. Le carcinome canalaire infiltrant était présent dans 63%, le lobulaire infiltrant 19%, les RH sont positifs dans 74,7%. Les RH étaient positifs dans 78% des cas. Une mastectomie a été faite dans 85% des cas avec abstention du curage axillaire dans 4.2%. Une hormonothérapie néoadjuvante dans 25.4% et une hormonothérapie exclusive dans 5.5%.

Discussion.

L'âge civil n'est pas fiable et l'âge physiologique est le plus important mais il n'est pas appréciable de manière uniforme, (1). La fréquence du cancer du sein à Oran chez les plus de 70 ans varie entre 4,1% et 1,0% avec une incidence respective pour 100000 de 141,0 et 08,7 (2). L'hormonothérapie pour les tumeurs RE+ reste la seule la référence du traitement systémique adjuvant. Pour les tumeurs présentant des facteurs pronostiques défavorables, la décision de chimiothérapie doit être soumise à la RCP (3). Certains auteurs ont utilisé une hormonothérapie première pendant 6 mois et ont obtenu 30 à 50% de réduction tumorale (4).

Conclusion.

La prise en charge des femmes âgées de plus de 70 ans doit être accentuée par rapport aux bénéfices attendus des traitements et la réduction de leurs effets secondaires. Il faut souligner que la priorité est d'assurer une surveillance rigoureuse en tenant compte de tous les effets secondaires.

Bibliographie.

1. Référentiel diagnostique et thérapeutique SEIN - REMAGUS 2019-2021
2. L. Mokhtari et al. Le Registre du cancer d'Oran, seize années d'enregistrement : Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique Volume 62, Supplément 5September 2014, Page S213.
3. Référentiel diagnostique et thérapeutique SEIN - REMAGUS 2019-2021.
4. Salmon, Eur J Surg Oncol 2003.