

# Epidémiologie du cancer du sein chez la femme jeune au Maroc

## Epidemiology of breast cancer in young women in Morocco

Fatiha Aboulhoda<sup>1,2</sup>, Abdelmajid Soulaymani<sup>1</sup>, Ghizlane Deghmaoui<sup>3</sup>, Houda Chahdi<sup>3</sup>, Mohamed Zraid<sup>3</sup>, Abdelrhani Mokhtari<sup>1</sup>, Hinde Hami<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Laboratoire de Génétique et Biométrie, Faculté des Sciences, Université Ibn Tofail, Kenitra, Maroc

<sup>2</sup>Délégation Provinciale de la Santé, Kenitra, Maroc

<sup>3</sup>Centre de Référence de la Santé Reproductive, Kenitra, Maroc

### Contexte et objectif

**Contexte :** Le cancer du sein chez la femme jeune représente un enjeu de santé publique important en raison de l'augmentation de sa prévalence et de ses conséquences physiologiques, psychologiques et socio-économiques. Selon les dernières estimations publiées par le Centre International de Recherche sur le Cancer, 11 081 nouveaux cas de cancer du sein chez les femmes de moins de 40 ans ont été diagnostiqués en Afrique du Nord en 2018, dont 2 761 décès.

**Objectifs :** Cette étude vise à décrire les caractéristiques épidémiologiques du cancer du sein chez la femme jeune (moins de 40 ans) dans l'ex-région Gharb-Chrarda-Béni Hssen au Maroc.



### Méthode

Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive portant sur les femmes dépistées pour le cancer du sein dans les établissements de santé publics et privés à Kenitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane, référées pour investigation au Centre de Référence de la Santé Reproductive de Kenitra (CRSRK) entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2018.

### Conclusion

Le cancer du sein chez la femme jeune est une affection de mauvais pronostic. Malheureusement, les jeunes femmes sont plus susceptibles de mourir d'un cancer du sein que les femmes plus âgées. L'élargissement de la fourchette d'âge du dépistage du cancer du sein pourra améliorer l'issue de la maladie et minimiser les coûts engendrés par cette maladie grâce à un diagnostic précoce.

### Résultats



### Discussion

En Afrique du Nord, l'augmentation de l'incidence du cancer du sein chez la femme jeune est une réalité épidémiologique. Suivant les résultats, l'âge moyen est légèrement important chez les femmes marocaines (34 ans) par rapport aux femmes tunisiennes (31,5 ans). Cependant, la fréquence des nullipares reste plus faible (2,5%) que celle retrouvée au Nord-Est du Maroc (43%). Dans cette étude, le sein gauche était le plus touché, contrairement à l'étude menée par Znati et al. en 2014. Le carcinome canalaire infiltrant et les tumeurs de grade SBR II étaient prédominants, résultats similaires à ceux de l'étude de Khanfir et al. (2006).