

Phytothérapie et thérapies orales anticancéreuses : Population concernée ? L'association est elle possible ?



J. DUCRAY¹, R. LARGILLIER², I. MILLANT¹, N. WISNIEWSKI¹, W. AZOUZA¹

¹ Pharmacie, Hôpital privé A. Tzanck, Mougins-Sophia Antipolis

² Oncologie médicale, Centre Azuréen de Cancérologie, Mougins

Contact : duc.julie2@wanadoo.fr



INTRODUCTION

Phytothérapie chez les patients atteints de cancer : un phénomène grandissant.

- Le risque d'interactions est connu.
 - Littérature parfois discordante.
 - Etudes robustes d'interactions plantes / thérapies orales anticancéreuses (TOA) : rares.
- L'objectif de notre étude est de décrire la population ayant recours à la phytothérapie en complément de leur traitement par TOA et d'évaluer l'impact de la consultation pharmaceutique (CP).

Travail d'analyse complexe

MATÉRIEL ET MÉTHODE

→ Etude prospective monocentrique

- 1 après-midi/semaine réalisation de CP de primo prescription de TOA dans notre centre :
- Analyse d'interactions à l'aide de deux bases de données : Hédrine-Thériaque et About Herbs MSKCC
 - Si interactions : Recommandations données aux patients, et oncologue référent informé.
- Nos outils d'analyse n'étant pas toujours exhaustifs, par mesure de précaution l'arrêt de la plante a été recommandé en cas d'absence de données.


RÉSULTATS

90 CP (45 min/CP en moyenne) de 01/2018 à 06/2019.

Population : 62 ♀ (68,9%) et 28 ♂ (31,1%), âgés de 70 ± 16 ans.

Patients ayant recours à la phytothérapie en fonction du type de cancer :



Femmes :



- Avec phytothérapie
- Sans phytothérapie

3 ± 2 plantes / patient en moyenne.


Hommes :



cancer du sein autres cancers

- sans recours à la phytothérapie
- ayant recours à la phytothérapie

Patients ayant recours à la phytothérapie :



- Au moins 1 interaction avec TOA
- Aucune interaction mise en évidence

En cas d'interaction, la recommandation a été l'arrêt d'au moins une plante (sauf 1 patient pour lequel un suivi biologique a été recommandé).

CONCLUSION / DISCUSSION

- ❖ 1/3 des patients sous TOA ont recours à la phytothérapie.
- ❖ Les **femmes** sont plus sujettes à la phytothérapie que les hommes.
- ❖ Les patientes atteintes d'un **cancer du sein** prennent plus souvent des plantes que les patients atteints d'un autre cancer.
- ❖ **Proportion importante d'interaction entre TOA et phytothérapie** : une prise de conscience de ce risque par les professionnels de santé et une sensibilisation des patients, apparaissent primordiales.



→ Lien ville/hôpital : rencontres organisées avec les pharmaciens d'officine afin de discuter du risque associé à la phytothérapie.

→ CP de suivi à mettre en place afin de vérifier que nos recommandations ont été suivies, et dans le cas contraire analyser les répercussions en termes de tolérance et d'efficacité de la TOA.