

Prise en charge chirurgicale des récidives homolatérales du cancer du sein par un 2nd traitement conservateur local

Camille PAJOT, Dr Laure Sophie TALAGRAND, Dr Enora LAAS

Contexte

Désescalade chirurgicale dans le cancer du sein localisé

Mastectomie totale → Mastectomie partielle

Gold standard de la récidive : **Mastectomie totale**



Chahada et al. Brachytherapy 2008


Chen et al. Am J Surg 2008

Désescalade chirurgicale lors de la récidive?



Objectif

Evaluer la **survie globale** et la **survie sans récidive** d'un 2nd traitement conservateur dans le cadre d'une récidive locale homolatérale d'un cancer du sein

Matériel & Méthode



→ Suivi médian après récidive : 30,4 mois



Résultats

Caractéristiques des patientes et des tumeurs

| | Population « contrôle » n=335 | 2 nd traitement conservateur n=117 |
|-------------------------|----------------------------------|--|
| Cancer initial | | |
| Age moyen (en années) | 58 | 56 |
| Type histologique : | | |
| - CCIS | 270 (80,6%) | 31 (28,2%) |
| - CCI | 65 (19,4%) | 71 (64,5%) |
| - CLI | - | 8 (7,3%) |
| Taille moyenne (en mm) | 14,6 | 13,7 |
| Récidive | | |
| Age moyen (en années) | 63 | 68 |
| Type histologique : | | |
| - CCIS | 197 (47,9%) | 33 (30%) |
| - CCI | 176 (42,8%) | 68 (61,8%) |
| - CLI | 32 (7,8%) | 9 (8,2%) |
| - Autres | 6 (1,5%) | - |
| Taille tumorale (en mm) | 15 | 11,6 |

Complications postopératoires
n=13 (11%)

Déhiscence n=3

Infection n=4

Reprise chirurgicale n=6
1 mastectomie

Évolution défavorable
n=13 (11,1%)

2^{ème} récidive homolatérale n=7
Mastectomie totale secondaire

Évolution métastatique n=2

Décès n=4

Conclusion

Un 2nd traitement conservateur peut être réalisé dans le cadre des récidives homolatérales locales de cancer du sein

Discussion

- +**
- ✓ Etude réalisée en centre expert dans la prise en charge du cancer du sein
 - ✓ Nombre important de patientes pour un évènement rare, une des plus grandes séries

-
- ✓ Etude rétrospective
 - ✓ Population de l'étude et population contrôle incluses sur des périodes différentes, pas de stratification pour la comparabilité des 2 groupes